




【用法用量】 成人：皮下注射。每日1次，每次1ml。 儿童：皮下注射。每日1次，每次0.5ml。 本品可与多种疫苗同时使用。	【不良反应】 本品不良反应发生率较低，主要表现为注射部位红肿、疼痛、瘙痒等。少数患者可能出现发热、乏力、头痛等全身反应。严重过敏反应罕见。	【禁忌】 对本品或本品所含任何成分过敏者禁用。患有严重过敏体质、正在接受免疫抑制剂治疗者慎用。
【注意事项】 本品为生物制品，应在阴凉处避光保存。使用前应检查包装完整性，如发现破损或漏液，不得使用。本品仅供皮下注射，不可静脉注射。	【规格】 每瓶含0.5ml、1ml、2ml、5ml、10ml、20ml、50ml、100ml、200ml、500ml、1000ml。	【贮藏】 于2~8℃避光保存和运输。
【包装】 中硼硅玻璃管制注射剂瓶，注射液用卤化丁基橡胶塞，1瓶/盒。	【有效期】 24个月。	【文献】 【儿童用药】 见【用法用量】项。
【临床试验】 本品在临床试验中显示良好的安全性和有效性，且无系统可靠的参考。	【老年用药】 未专门进行该项针对性文献。	【药物相互作用】 本品与免疫球蛋白有相互作用，可能会与本品产生沉淀。本品与疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
【不良反应】 本品不良反应发生率较低，主要表现为注射部位红肿、疼痛、瘙痒等。少数患者可能出现发热、乏力、头痛等全身反应。严重过敏反应罕见。	【批准文号】 国药准字S20063001	【生产企业】 企业名称：博晖生物制药（河北）有限公司
【用法用量】 成人：皮下注射。每日1次，每次1ml。 儿童：皮下注射。每日1次，每次0.5ml。 本品可与多种疫苗同时使用。	【规格】 每瓶含0.5ml、1ml、2ml、5ml、10ml、20ml、50ml、100ml、200ml、500ml、1000ml。	【贮藏】 于2~8℃避光保存和运输。
【包装】 中硼硅玻璃管制注射剂瓶，注射液用卤化丁基橡胶塞，1瓶/盒。	【有效期】 24个月。	【文献】 【儿童用药】 见【用法用量】项。
【临床试验】 本品在临床试验中显示良好的安全性和有效性，且无系统可靠的参考。	【老年用药】 未专门进行该项针对性文献。	【药物相互作用】 本品与免疫球蛋白有相互作用，可能会与本品产生沉淀。本品与疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
【不良反应】 本品不良反应发生率较低，主要表现为注射部位红肿、疼痛、瘙痒等。少数患者可能出现发热、乏力、头痛等全身反应。严重过敏反应罕见。	【批准文号】 国药准字S20063001	【生产企业】 企业名称：博晖生物制药（河北）有限公司
【用法用量】 成人：皮下注射。每日1次，每次1ml。 儿童：皮下注射。每日1次，每次0.5ml。 本品可与多种疫苗同时使用。	【规格】 每瓶含0.5ml、1ml、2ml、5ml、10ml、20ml、50ml、100ml、200ml、500ml、1000ml。	【贮藏】 于2~8℃避光保存和运输。