

博晖生物

核准日期：2006年03月02日

并

人免疫球蛋白说明

教师指导下使用

请仔细阅读说明书并在

产康计划 为了配合分娩计划有效实施,产妇应在分娩前2~3天开始进食

第三讲：十口头上而流眼泪 只能以心悟悟万法

传播的可能。”临床使用时应权衡利弊。

【茹旦夕種】

「迎絡」

Abstract

用法用量

白。本品系由健康人血浆，与层析法分离纯化，并经低和DV50pH4纳米膜过滤处理，制成。

用法：只限于肌肉注射，不得用于静脉输注。

用量、用法、间隔

预防麻疹: 为预防发病或减轻症状, 可在与麻疹患者

接种后应每隔公斤体重注射0.15~0.17ml,5岁以下儿童注射1.5~3.0ml,6岁以上儿童最大注射量不超过6ml。一次注射预防效果通常为2~4周。

色敗後黃色澄清液係：呋甾酮元之不顯現

不良反应

尚待积累和规范不良反应的监测资料。少数人会出

● 劉佳紅 鄧世英 廖一雲 廖一雲 方蘭 鄧永輝 鄧永輝

【成份】

主要成份为人免疫球蛋白
经低温乙醇蛋白分离法
pH (pH4.0) 病毒灭活
而成。本品呈

1. 性状

应为本

译注

『送应生』

【禁忌】

免疫球蛋白过敏或有其他严重过敏史者。

IgA抗体的选择性IgA缺乏者。

【事项】

于抗体与抗原相互作用起到直接中和毒素与杀灭细菌和病毒，因此免疫球蛋白制品对预防细菌、病毒性

感染有一定的作用。

毒理研究 尚不清楚。

1. 对

2. 有

【注意】

3. 运输及贮存过程中严禁冻结。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统

【贮藏】

于2~8℃避光保存和运输。

【包装】

可靠的 《中国药典》2025年版三部和YBS00252013

【批准文号】

国药准字S20063021 300mg/瓶

作用的药物可 国药准字S20063020 150mg/瓶

【药品上市许可持有人】

博晖生物制药(河北)有限公司

大在注射部位造成疼

【生产企业】

企业名称：博晖生物制药(河北)有限公司

生产地址：石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路6号

参考文献

【药物相互作用】

应单独使用。凡对免疫球蛋白有相互能会对本品产生相互作用。

【药物过量】

可能产生变异反应和因剂量痛感。

【药理毒理】

内含有的大量抗体输给受者，使之从低或无免疫状态很快达到暂时免疫保护状态，而

是把免疫球蛋白